



# レブロジル®を投与される 患者さんへ

監修:独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院  
血液・腫瘍内科 副院長  
小川 亮介 先生

 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社

注:レブロジルは米国Celgene Corporation (Bristol-Myers Squibbの関係会社)の登録商標です。

# はじめに

レブロジル<sup>®</sup>は骨髄異形成症候群(MDS)に伴う貧血の治療薬です。

この冊子ではレブロジル<sup>®</sup>で治療されるMDSの患者さんへ、お薬のはたらきや投与方法、副作用などを紹介します。

MDSでは一見して貧血とは思えないような症状がみられたり、症状に慣れてしまい自覚しにくくなっていることもあります。

ふだんの生活で不安なことや悩みがあってもおひとりで抱え込まず、主治医または看護師・薬剤師に相談しながら治療を続けていきましょう。



# 目次


レボジル<sup>®</sup>で治療を開始する前に ..... P.4

レボジル<sup>®</sup>のはたらき ..... P.5

レボジル<sup>®</sup>の主な副作用 ..... P.6

レボジル<sup>®</sup>の投与方法 ..... P.8

自分の体調を伝える ..... P.14



# レボロジル<sup>®</sup>で治療を開始する前に

レボロジル<sup>®</sup>の投与対象となる患者さん

▶ 骨髄異形成症候群に伴う貧血のある患者さん

以下に該当する患者さんは、治療開始前に主治医にお伝えください。

妊娠している、または今後妊娠を検討している




授乳している



# レプロジル®のはたらき

骨髄異形成症候群(MDS)では、造血幹細胞が異常になり、正常にはたらく赤血球が少なくなることで、貧血症状があらわれます。



レプロジル®のはたらきにより、  
正常な赤血球の数が増加すると考えられています。

レプロジル®電子添文

# レボロジル®の主な副作用

よくみられる副作用

吐き気・嘔吐



頭痛



高血圧



注射部位反応  
(紅斑、痛み、かゆみ、発疹、腫れ)



疲労



それ以外にも以下のような症状が出ることがあります

## 頭部

- めまい  
(ふわふわと浮く  
ようなめまい)

## 呼吸器


- 呼吸困難

## 消化器

- 嘔吐
- 肝機能検査値  
(ALT、AST)の  
増加
- 下痢

## 全身


- 筋肉痛
- 骨痛
- 好中球減少症
- 血小板減少症
- 力が入らない
- そう痒症
- 疼痛
- 高尿酸血症



ここで示した副作用がレプロジル®でみられる副作用の  
すべてではありません。  
気になる症状があれば、主治医または看護師・薬剤師に  
相談しましょう。

# レブロジル<sup>®</sup>の投与方法

レブロジル<sup>®</sup>は3週間間隔で皮下注射します



レブロジル<sup>®</sup>の投与量は体重により異なります


- 投与量によっては、2～3か所に注射することがあります。





# レブロジル<sup>®</sup>は患者さんの状態にあわせて用量調節ができます

## 増量の場合



治療中に貧血症状の改善  
が感じられない場合は、主治医  
または看護師・薬剤師に  
相談しましょう。

主治医にお伝えするポイントは  
14,15ページを参照ください。



効果が見られない場合

増量

3回目



- 同じ用量を2回投与して効果が見られない場合は1段階増量します。
- 同様に、2段階まで増量可能です。



# レブロジル<sup>®</sup>は患者さんの状態にあわせて用量調節ができます

## 減量の場合



投与量については主治医が判断します。レブロジル<sup>®</sup>投与後に気になる症状があれば主治医に相談しましょう。

ご自身の判断で通院頻度を変更しないようにしましょう。

主治医にお伝えするポイントは14,15ページを参照ください。



- ・ヘモグロビン濃度が一定値を超える場合
- ・ヘモグロビン濃度の急激な上昇が認められた場合
- ・副作用がみられた場合



減量・  
投与中断

減量または一旦投与を  
中断することがあります。



# 主治医に投与後の 体調の変化について 話してみましょう



ポイント①  
投与後、症状に変化はありましたか？



少し良くなった



あまり変わらない



悪くなった



## ポイント② 投与後に気になる副作用はありましたか？



気持ち悪くなった



だるくなった



注射した部位が痛くなった

レブロジル®の主な副作用は6,7ページを参照ください。

レブロジル®について、  
こちらのウェブサイトでも紹介しています。  
ぜひご覧ください。

レブロジル.jp | <https://reblozyl.jp/patient>



医療機関名：